

Lista de verificación para el farmacéutico – Guía para dispensar Roacnetán[®] ▲

▲ Este medicamento está sujeto a monitoreo adicional. Esto permitirá la identificación rápida de nueva información de seguridad. Se les pide a los profesionales de salud que reporten todos los eventos adversos detectados. La información y los formularios de reporte se pueden encontrar en el sitio web del Instituto de Salud Pública de Chile.

Para dudas o consultas respecto al medicamento, o si usted quiere informar un evento adverso: Llame a 800 365 365, o envíe un correo a: chile.farmacovigilancia@roche.com

Derechos reservados – está prohibida la reproducción total o parcial sin previa autorización de Roche Chile Ltda.

M-CL-00002514

Roacnetán[®]
Isotretinoína

Lista de verificación para el farmacéutico

Guía para dispensar

Roacnetán[®] pertenece a la clase de fármacos retinoides que causan defectos de nacimiento severos. La exposición fetal a Roacnetán[®], incluso por períodos cortos, presenta un alto riesgo de malformaciones congénitas y abortos espontáneos.

Por lo tanto, Roacnetán[®] está estrictamente contraindicado durante el embarazo y en mujeres en edad fértil, a menos que se cumplan todas las condiciones del programa de prevención del embarazo de Roacnetán[®].

Si usted sabe que una mujer ha quedado embarazada durante el tratamiento con Roacnetán[®], el tratamiento debe suspenderse de inmediato y la mujer debe ser referida inmediatamente al médico que ha recetado Roacnetan[®].



Si usted sabe que una paciente ha quedado embarazada durante el mes después de haber suspendido el tratamiento con Roacnetán[®], debe referirla al médico que ha recetado Roacnetan[®].

Como farmacéutico, solo debe dispensar Roacnetán[®] después de verificar la siguiente información:

Para mujeres en edad fértil:

- Con el fin de mantener un seguimiento regular del paciente (pruebas de embarazo y monitoreo), la receta de Roacnetán[®] idealmente debe limitarse a un suministro de 30 días.
-

Debe instruirse a todos los pacientes:

- Nunca darle el Roacnetán[®] a otra persona. 
- Devolver cualquier cápsula sin usar a su farmacéutico al final del tratamiento. 
- No donar sangre durante la terapia con Roacnetán[®] y durante un mes después de la suspensión del medicamento debido al riesgo potencial de malformación del feto. 

Puede acceder a información detallada y actualizada sobre este medicamento a través de **www.roche.cl**



O a través de **Dialogo Roche** (www.dialogoroche.cl)